

Anexos:

**Tabla 1.** Criterios para el diagnóstico y severidad de la hipoglicemia.

| Leve (nivel 1)                                                                   | Modera (nivel 2)                                                                                                                                                        | Severa (nivel 3)                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signos autonómicos: temblor, palpitaciones, transpiración, náuseas presentes y/o | Síntomas autonómicos y neuroglucopénicos (Dificultad para concentrarse, Confusión, debilidad, somnolencia, cambios en la visión, dolor de cabeza, mareos) presentes y/o | Podría estar inconsciente. Evento severo caracterizado por alteraciones mentales y físicas y/o |
| Glucosa menos 70 mg/dL y $\geq 54$ mg/dL (3.9 mmol/L)                            | Glucosa < 54 mg/dL (3 mmol/L)                                                                                                                                           | Glucosa usualmente menor de 50 mg/dL (2.8 mmol)                                                |

Fuente: Hurtado HA, Gil-Olivares FE, Castillo-Bravo L, Perez-Tazzo L, Campomanes-Espinoza GC, Aliaga-Llerena K, et al. Manejo de las crisis glucémicas en pacientes adultos con diabetes mellitus: guía de práctica clínica basada en evidencias. RevFacMedHum. 2021;21(1):50–64. <https://doi.org/10.25176/RFMH.v21i1.3194>


**Tabla 2.** Principales signos y síntomas por intoxicación según grupo antihipertensivo

| BB | BCC | ARA II |
|----|-----|--------|
|----|-----|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bradicardia o taquicardia.</li> <li>• Hipertensión o hipotensión</li> <li>• Bloqueo cardíaco</li> <li>• Vómito</li> <li>• Síntomas respiratorios</li> <li>• Síntomas neurológicos inespecíficos como cefalea, mareos, que</li> <li>• clásicamente dura de 12 a 2 horas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hipoperfusión periférica</li> <li>• Alteración del sensorio</li> <li>• Oliguria</li> <li>• En los inicios del shock se presenta taquicardia refleja que posteriormente evoluciona a bradicardia por bloqueo de los nodos cardíacos</li> <li>• Edema pulmonar cardiogénico</li> <li>• Insuficiencia respiratoria aguda secundaria a la vasodilatación del lecho pulmonar.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hipotensión</li> <li>• Fatiga</li> <li>• Disnea</li> <li>• Náuseas</li> <li>• Somnolencia</li> <li>• Sincope</li> <li>• Taquicardia</li> <li>• Bradicardia</li> <li>• Fiebre (menos del 1%)</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fuente: Lauterbach M. Clinical toxicology of beta-blocker overdose in adults. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2019;125(2):178–86. & Bermúdez del Sol A, Proaño Sandoval W, Avendaño Castro LP, Zambrano Vera G. Intoxicación aguda por tramadol: reporte de un caso clínico. RevUniv Soc. 2021;13(6):555–9.


**Figura 1.** Algoritmo del abordaje general de intoxicación en el adulto mayor



Nota: \*En el abordaje inicial considerar enviar exámenes de laboratorio dependiendo de los recursos disponibles.

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de Guth Brunner T, López Águila D. Intoxicaciones más comunes en la población geriátrica de Costa Rica del 2015 al 2020: causas, agentes y rutas de intoxicación. AnGerontol. 2021;13(13):90-116. & Barman B, Bora K, Nongpiur A. Poisoning in elderly. Indian J MedSpec. 2018;9(3):113-7. <https://doi.org/10.1016/j.injms.2018.04.008>


**Figura 2.** *Algoritmo del abordaje general de intoxicación por hipoglicemiantes en el adulto mayor*



Nota: \*Se consideran equivalentes de 12 a 20 g de glucosa: dos sobres o 3 cucharaditas de azúcar con agua, 175 ml de refresco, 15 ml de miel, una porción de fruta o tres galletas

Fuente: Elaboración propia. Información tomada Bermúdez del Sol A, Proaño Sandoval W, Avendaño Castro LP, Zambrano Vera G. Intoxicación aguda por tramadol: reporte de un caso clínico. RevUniv Soc. 2021;13(6):555–9. & Reyes-García R, et al. Resumen ejecutivo: documento de posicionamiento: evaluación y manejo de la hipoglucemia en el paciente con diabetes mellitus 2020. Grupo de Trabajo de Diabetes Mellitus de la Sociedad Española de

**Figura 3.** *Algoritmo del abordaje general de intoxicación por antihipertensivos en el adulto mayor*



Fuente: Elaboración propia. Información tomada de Duque J. Experiencia en el manejo de intoxicaciones por betabloqueadores y calcioantagonistas: serie de casos y revisión de la literatura [Internet]. 2020 [citado 9 de abril de 2023]. Disponible en: <http://rev.aetox.es/wp/wp-content/uploads/2020/06/vol-37.1-1-75.pdf>