

## ANEXOS

**Tabla 1. Características de los pacientes.**

| Característica                                   |            |             |
|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Género – n° (%)</b>                           | Hombre     | Mujer       |
|                                                  | 47 (55.95) | 37 (44.04%) |
| <b>Edad</b>                                      |            |             |
| Promedio – años                                  | 51.59      | 51.51       |
| <b>Hipertensión arterial sistémica – n° (%)</b>  | 42 (50)    | 36 (42.85)  |
| <b>Diabetes mellitus – n° (%)</b>                | 32 (38.09) | 21 (25)     |
| <b>Cardiopatía isquémica crónica – n° (%)</b>    | 6 (7.14)   | 0 (0)       |
| <b>Modalidad de diálisis peritoneal – n° (%)</b> |            |             |
| DPCA *                                           | 39 (46.42) | 34 (40.47)  |
| DPA †                                            | 4 (4.76)   | 3 (3.57)    |
| DPI ‡                                            | 4 (4.76)   | 0 (0)       |
| <b>Tiempo en diálisis</b>                        |            |             |
| Promedio – meses                                 | 21         | 25.70       |
| <b>Celularidad líquido diálisis – n° (%)</b>     |            |             |
| <500 cels/μl                                     | 16 (19.04) | 8 (9.52)    |
| 500-1000 cels/μl                                 | 8 (9.52)   | 7 (8.33)    |
| >1000 cels/μl                                    | 23 (27.38) | 22 (26.19)  |

\* Diálisis peritoneal continua ambulatoria † Diálisis peritoneal automatizada ‡ Diálisis peritoneal intermitente

**Tabla 2. Microorganismos aislados\***

| Patógeno                       | Cultivo convencional<br>(N= 84) | Cultivo en frasco de hemocultivo<br>(N= 84) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Con crecimiento– n° (%)</b> | 45 (53.57)                      | 65 (77.38)                                  |
| <i>S. aureus</i>               | 20 (44.44)                      | 30 (46.15)                                  |
| <i>P. aeruginosa</i>           | 5 (11.11)                       | 9 (13.84)                                   |
| <i>K. pneumoniae</i>           | 5 (11.11)                       | 5 (7.69)                                    |
| <i>S. epidermidis</i>          | 4 (8.88)                        | 5 (7.69)                                    |
| <i>E. coli</i>                 | 3 (6.66)                        | 4 (6.15)                                    |
| <i>C. parasilopsis</i>         | 1 (2.22)                        | 2 (3.07)                                    |
| <i>E. cloacae</i>              | 1 (2.22)                        | 1 (1.53)                                    |
| <i>E. faecium</i>              | 1 (2.22)                        | 1 (1.53)                                    |
| <i>K. oxytoca</i>              | 1 (2.22)                        | 1 (1.53)                                    |
| <i>Streptococcus</i> spp.      | 1 (2.22)                        | 1 (1.53)                                    |
| <i>S. warnerii</i>             | 1 (2.22)                        | 1 (1.53)                                    |
| <i>C. amycolatum</i>           | 1 (2.22)                        | 1 (1.53)                                    |
| <i>P. luteola</i>              | 1 (2.22)                        | 1 (1.53)                                    |
| <i>C. striatum</i>             | 0                               | 2 (3.07)                                    |
| <i>L. garviae</i>              | 0                               | 1 (1.53)                                    |
| <i>Enterococcus</i> spp.       | 0                               | 1 (1.53)                                    |
| <b>Sin crecimiento– n° (%)</b> | 39 (46.42)                      | 19 (22.61)                                  |

\* Prueba exacta de Fisher  $p < 0.001$

**Tabla 3. Precisión diagnóstica.**

| <b>Método de cultivo</b> | <b>Cultivo en frasco<br/>de hemocultivo</b> | <b>Cultivo<br/>convencional</b> |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Sensibilidad - (%)       | 97.77                                       | 67.69                           |
| Especificidad- (%)       | 46.15                                       | 94.73                           |
| VPP - (%)                | 67.69                                       | 97.77                           |
| VPN - (%)                | 94.73                                       | 46.15                           |
| LR +                     | 1.81                                        | 12.8                            |
| LR -                     | 0.04                                        | 0.34                            |

VPP = valor predictivo positivo, VPN= valor predictivo negativo, LR+ = razón de verosimilitud positiva, LR- =razón de verosimilitud negativa