

Anexos.

CRITERIOS CLINICOS URTICARIA MULTIFORME

1-Morfología y configuración anular y policíclicas típicas de las lesiones de urticaria

Pueden existir cambios transitorios y equimóticos en la piel.

Ausencia de lesiones diana verdaderas y / o necrosis de la piel o ampollas

Ausencia de afectación de la membrana mucosa con ampollas o erosiones.

2-Duración de las lesiones individuales de menos de 24 h.

3-Dermatografismo

4-Angioedema pero no artralgias o artritis.

El angioedema típicamente involucra las manos y / o los pies, pero también puede involucrar mucosa periocular u oral; los niños con edema significativo de los pies pueden encontrar caminar difícil, que no debe confundirse con artritis o artralgias

5-Respuesta favorable a los antihistamínicos.

Preferentemente antihistamínicos H1 de segunda generación

Pueden estar presentes elevaciones moderadas pero no significativas en los reactantes de fase aguda.

Recuento de glóbulos blancos, velocidad de sedimentación globular o proteína C reactiva

el nivel puede estar ligeramente elevado pero no demuestra las elevaciones típicamente

visto en pacientes con trastornos reumatológicos, infecciones sistémicas graves o

La enfermedad de Kawasaki

(tabla 1)



Imagen 1