

Pérdida sensorial dual (DSL) en población adulta mayor: un estudio en Centros de Mayores

Tabla 1: Caracterización sensorial de los residentes examinados.

	IPVA [*]	PVA ^β	PA [†]	PTA ^Φ	HFPTA [‡]	DSL ^ƒ
Total	48,50%	0.48 ± 0.25	58,00%	30,74 ± 13,89	38,96 ± 15,1	31,50%
GÉNERO						
Hombres	47,50%	0.48 ± 0.24	63,90%	31,34 ± 14,65	42,70 ± 15,74	34,40%
Mujeres	48,50%	0.49 ± 0.25	54,70%	30,16 ± 13,39	37,05 ± 14,57	29,60%
EDAD						
60-69 años	31,30%	0.70 ± 0.30	56,30%	24,00 ± 14,89	31,72 ± 15,08	25,00%
70-79 años	38,50%	0.51 ± 0.23	47,70%	26,17 ± 13,58	34,38 ± 16,37	18,50%
80-89 años	53,20%	0.46 ± 0.24	59,60%	32,60 ± 12,25	40,80 ± 13,16	35,50%
≥90 años	72,70%	0.31 ± 0.20	83,30%	40,62 ± 14,01	49,58 ± 12,86	59,10%

* % de sujetos con IPVA (PVA < 0.5; ojo mejor).

β Presenting visual acuity (ojo mejor; valor promedio).


†% de sujetos con pérdida auditiva (criterio internacional de Ventry & Weinstein).

Φ Pérdida auditiva media (oído mejor),

‡ Pérdida auditiva media en las altas frecuencias (oído mejor).

ƒ % Total de sujetos con pérdida sensorial dual.

Gráfico 1: Perfiles audiométricos de los residentes con/sin IPVA*



* Umbrales tonales promedio del oído con mejor audición.

Tabla 2: Caracterización auditiva de los residentes con/sin IPVA.

	DÉFICIT AUDITIVO [*]	PTA [†]	HFPTA ^Φ
No IPVA n=204	50,50%	27,40 ± 12,62	35,94 ± 15,29
Si IPVA n=192	64,60%	33,88 ± 14,45	41,90 ± 14,64
GRADO DE IPVA			
IPVA Medio	51,40%	27,86 ± 11,99	36,45 ± 12,04
IPVA Moderado	72,30%	37,72 ± 15,40	44,73 ± 16,11
Ceguera	75,00%	37,41 ± 11,94	47,60 ± 11,08

*

% de sujetos con pérdida auditiva (criterio internacional de Ventry & Weinstein).

[†] Pérdida auditiva media (oído mejor)

^Φ Pérdida auditiva media en las altas frecuencias (oído mejor).