

Perfil cardiovascular de pacientes hipertensos

TABLAS

Tabla 1: Distribución por sexo y grupos de edades de los pacientes hipertensos. CMF 19, Policlínico Victoria Cuba-Angola, Municipio Boyeros.

GRUPO DE EDADES (EN AÑOS)	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
18-20	2	4.44%	8	1.77%	10	2.22%
21-25	5	1.11%	10	2.22%	15	3.33%
26-30	5	1.11%	15	3.33%	20	4.44%
31-35	26	5.77%	24	5.33%	50	11.1%
36-40	30	6.66%	24	5.33%	54	12%
41-45	34	7.55%	26	5.77%	60	13.3%
45-50	29	6.44%	30	6.66%	59	13.1%
51-55	16	3.55%	42	9.33%	58	12.8%
56-60	38	8.44%	38	8.44%	76	16.8%
60-65	28	6.22%	20	4.44%	48	10.66%
Total	213	47.3%	237	52.6%	450	100%

Fuente: Historia Clínica y Encuesta realizada.

Tabla 2: Control de la Presión Arterial en el momento de la consulta. CMF 19, Policlínico Victoria Cuba-Angola, Municipio Boyeros.

CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL	Nº	%
Controlados	287	63.7
No controlados	163	36.3

Fuente: Examen físico y Encuesta realizada.

Tabla 3: Relación entre tiempo de evolución de hipertensión arterial e hipertrofia ventricular izquierda. CMF 19, Policlínico Victoria Cuba-Angola, Municipio Boyeros.

TIEMPO DE EVOLUCIÓN (AÑOS)	HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA			
	Nº	Sí (%)	Nº	No (%)
< 2	18	18.4	143	40.6
2-10	23	23.5	113	32.1
> 10	57	58.1	96	27.3
Total de pacientes	98	21.8	352	78.2

Fuente: Electrocardiograma, Índice cardiotorácico y Encuesta realizada.

HVI*: Hipertrofia Ventricular Izquierda.

Tabla 4: Relación entre tiempo de evolución de hipertensión arterial y enfermedad coronaria. CMF 19, Policlínico Victoria Cuba-Angola, Municipio Boyeros.

TIEMPO DE EVOLUCIÓN(AÑOS)	ENFERMEDAD CORONARIA			
	Nº	Sí (%)	Nº	No (%)
< 2	8	7.6	153	44.3
2-10	44	41.9	92	26.7
> 10	53	50.5	100	29
Total de pacientes	105	23.3	345	76.7

Fuente: Electrocardiograma y Encuesta realizada.

Tabla 5: Factores de riesgo de lesión vascular. CMF 19, Policlínico Victoria Cuba-Angola, Municipio Boyeros.

FACTORES DE RIESGO DE LESIÓN VASCULAR	Nº	%
Fumadores	235	52.2%
Diabetes Mellitus	107	23.7%
Hiperlipoproteinemia	54	12%
Obesidad	49	10.8%

Fuente: Historia Clínica y Encuesta realizada.

Tabla 6: Relación entre tiempo de evolución de la hipertensión arterial y la intensidad de filtrado glomerular. CMF 19, Policlínico Victoria Cuba-Angola, Municipio Boyeros.

TIEMPO DE EVOLUCIÓN (AÑOS)	INTENSIDAD DE FILTRADO GLOMERULAR			
	No.	IFG>90	No.	IFG<90
< 2	155	37.4%	6	16.8%
2-10	121	29.2%	15	41.6%
> 10	138	33.3%	15	41.6%
Total de pacientes	414	92%	36	8%

Fuente: Historia Clínica y Encuesta realizada.

Tabla 7: Asociación entre el grado de retinopatía y el estadio de la HTA. CMF 19, Policlínico Victoria Cuba-Angola, Municipio Boyeros.

Grado de retinopatía					
HTA	I	II	III	Total	(%)
Ligera	33	27		60	36.4
Moderada	42	54	9	105	63.6
Total	75	81	9	165	100

Fuente: Estudios realizados a pacientes y Encuesta realizada.