

Efectividad de una charla educativa sobre salud oral y embarazo en una población de embarazadas del área metropolitana de Granada

FIGURAS




Tabla 1. Distribución de las embarazadas entrevistadas por edad

| Edad | Número de Embarazadas | Porcentaje |
|------|-----------------------|------------|
| 17 | 3 | 1.0% |
| 18 | 3 | 1.0% |
| 20 | 5 | 1.7% |
| 21 | 11 | 3.7% |
| 23 | 7 | 2.3% |
| 24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 14 | 4.7% |
| 26 | 17 | 5.7% |
| 27 | 18 | 6.0% |
| 28 | 23 | 7.7% |
| 29 | 23 | 7.7% |
| 30 | 23 | 7.7% |
| 31 | 22 | 7.3% |
| 32 | 20 | 6.7% |
| 33 | 23 | 7.7% |
| 34 | 20 | 6.7% |
| 35 | 16 | 5.3% |
| 36 | 12 | 4.0% |
| 38 | 10 | 3.3% |
| 39 | 7 | 2.3% |
| 40 | 6 | 2.0% |
| 42 | 4 | 1.3% |
| 43 | 1 | 0.3% |
| 45 | 2 | 0.6% |

Tabla 2. Lugar de residencia de las embarazadas entrevistadas.

| Centro de Salud | Lugar de Residencia | Entrevistadas | Porcentaje |
|-------------------|---------------------|---------------|------------|
| C. Salud. ARMILLA | Armillá | 99 | 33% |
| | Alhendin | 30 | 10% |
| C. Salud ATARFE | Atarfe | 78 | 26% |
| | Albolote | 91 | 30% |
| | Colomera | 2 | 1% |

Tabla 3. Lugar de procedencia de las embarazadas entrevistadas

| Lugar de Residencia | Número de entrevistadas | Porcentaje |
|---------------------|-------------------------|------------|
| España | 242 | 80,7% |
| Marruecos | 31 | 10,3% |
| Rumanía | 12 | 4% |
| Sudamérica | 12 | 4% |
| Senegal | 1 | 0,3% |
| China | 2 | 0,7% |

Tabla 4. Nivel educativo de las embarazadas entrevistadas.

| Nivel Educativo | Número de Entrevistadas | Porcentaje |
|-------------------------------|-------------------------|------------|
| Educación Primaria o inferior | 47 | 15.7% |
| Educación Secundaria | 159 | 53,0% |
| Bachillerato | 39 | 13,0% |
| FP ciclo medio | 20 | 6,7% |
| FP ciclo superior | 16 | 5,3% |
| Estudios Universitarios* | 7 | 2,3% |
| Postgrado | 2 | 0,7% |
| Doctorado | 1 | 0,3% |
| No responde | 9 | 3,0% |

*: Diplomatura, Grado o Licenciatura

Tabla 5. Situación laboral de las embarazadas entrevistadas

| Situación | Número de entrevistadas | Porcentaje |
|---------------------------|-------------------------|------------|
| Parada | 52 | 17,3% |
| Trabajo a tiempo parcial | 59 | 19,7% |
| Trabajo a tiempo completo | 99 | 33% |
| Ama de casa | 90 | 30% |

Tabla 6. Embarazadas derivadas por la matrona a la consulta de Odontología

| Acceso | Número de entrevistadas | Porcentaje |
|--------------|-------------------------|------------|
| Derivadas | 264 | 88% |
| No derivadas | 36 | 12% |

Tabla 6. A Embarazadas derivadas por la matrona a la consulta de Odontología. C. Salud Armilla

| Acceso | Número de entrevistadas | Porcentaje |
|--------------|-------------------------|------------|
| Derivadas | 114 | 88% |
| No derivadas | 15 | 12% |

Tabla 6.B. Embarazadas derivadas por la matrona a la consulta de Odontología. C. Salud Atarfe

| Acceso | Número de entrevistadas | Porcentaje |
|--------------|-------------------------|------------|
| Derivadas | 150 | 88% |
| No derivadas | 21 | 12% |

Tabla 7. Trimestre de gestación de las embarazadas encuestadas

| Estadío de la gestación | Embarazadas entrevistadas | Porcentaje |
|-------------------------|---------------------------|------------|
| Primer trimestre | 40 | 13% |
| Segundo trimestre | 242 | 81% |
| Tercer trimestre | 18 | 6% |

Tabla 8. Motivo por el que las embarazadas no acuden a la consulta de Odontología

| ¿Por qué no acude al dentista durante el embarazo | Embarazadas encuestadas | Porcentaje |
|---|-------------------------|------------|
| Daña al feto | 228 | 76% |
| La anestesia es perjudicial | 246 | 82% |
| Los materiales son dañinos | 138 | 46% |
| Tiene miedo al dentista | 180 | 60% |
| No es importante | 132 | 44% |

Tabla 9. Causas de las alteraciones bucales durante el embarazo

| Causa de las alteraciones bucales | Embarazadas encuestadas | Porcentaje |
|---|-------------------------|------------|
| Cambios hormonales | 144 | 48% |
| Higiene deficitaria | 60 | 20% |
| Ingesta elevada de alimentos dulces | 42 | 14% |
| Combinación de los tres factores anteriores | 48 | 16% |

Tabla 10. Tratamientos recibidos por las gestantes durante el embarazo.

| Tratamientos | Embarazadas encuestadas | Porcentaje |
|-------------------------------|-------------------------|------------|
| Tratamiento rutinario | 2 | 1% |
| Tratamiento de urgencia | 6 | 2% |
| Tartrectomía | 16 | 5% |
| Educación dental y prevención | 22 | 7% |
| Ninguno | 254 | 85% |

Tabla 11. Comparación de las respuestas previas y posteriores a la actividad educativa

| Preguntas | Pres-test correcto | Post-test correcto | Índice mcNemar |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| Es importante el tratamiento odontológico durante el embarazo | 168 (56%) | 287 (96%) | 52 |
| El tratamiento dental hace daño al feto | 72 (24%) | 270 (90%) | 4,9 |
| ¿La anestesia es perjudicial para el feto? | 54 (18%) | 206 (69%) | 6,4 |
| ¿Los materiales dentales son dañinos para el feto? | 162 (54%) | 250 (83%) | 30 |
| ¿Cuáles son las causas de las alteraciones de la salud bucal en las embarazadas? | 48(16%) | 290 (97%) | 4 |