

**Intervención educativa sobre sepsis vaginal en el embarazo adolescente**

Municipio Caimanera. Artículo original. **Anexos**

Tabla Nº 1 Distribución de la población según algunas variables sociodemográficas de interés. N: 30

Edades	Nº	%	Estudia	%	Trabaja	%	Sin empleo	%	Total	%
10 –13	8	27	8	27	–	–	–	–	8	27
14 –16	12	40	12	40	–	–	–	–	12	40
17 –19	10	33	6	20	4	13	–	–	10	33
Total	30	100	26	87	4	13	–	–	30	100

Fuente: encuesta

Tabla Nº 2 Distribución de la población según nivel de conocimiento de los síntomas de las enfermedades antes y después de la intervención. N: 30

Síntomas	Antes	%	Después	%
Fetidez vaginal	12	40	30	100
Picor vaginal	8	27	29	97
Comezón vaginal	6	20	28	93
Dolor vaginal	9	30	30	100
ardor al orinar	7	23	28	
flujo con mal olor	10	33	30	10
Dolor las relaciones sexuales	5	17	29	97
Irritación Vaginal	8	27	30	100
Sangrado con las relaciones sexuales	6	20	30	100
Vagina caliente	4	13	27	90
Nada	6	20	30	100

Fuente: encuesta

Tabla Nº 3 Distribución de la población según los niveles de conocimientos de las jóvenes sobre las complicaciones maternas. N: 30

Nivel de conocimientos	Antes	%	Después	%
Sepsis puerperal	4	13	30	100
Rotura prematura de membrana	6	20	28	93
Aborto	8	27	30	100
Parto pretérmino	5	17	27	
Endometritis	3	10	28	
Cistitis	4	13	27	90
Tromboflebitis	2	7	28	93
Sepsis generalizada	4	13	27	90
Proteólisis del tapón mucoso	–	–	28	93
Amenaza de parto prematuro	6	20	30	100
Meningoencefalitis	1	3	27	
Muerte materna	7	23	30	100

Fuente: encuesta

Tabla Nº 4 Distribución de la población según los niveles de conocimientos sobre las complicaciones para el producto de la concesión. N: 30

Nivel de conocimiento	Antes	% –	Después	%
Prematuridad	5	17	28	93
Bajo peso	7	23	29	97
CIUR	6	20	27	90
Infección ovular	4	13	28	93
Infección neonatal	6	20	29	97
Ceguera	4	13	28	93
Sordera	3	10	27	90
Enfermedad membrana hialina	2	7	28	93
Sepsis generalizada	4	13	27	90
Desnutrición	5	17	29	97
Riesgo de óbito fetal	5	17	29	97
Broncoaspiración de líquido amniótico, meconio	4	13	27	90
Discapacidad	3	10	27	90
Mortalidad neonatal	6	20	30	100
Mortalidad infantil	7	23	30	100

Fuente: encuesta

Tabla Nº 5 Distribución de las adolescentes según el nivel de conocimiento sobre el tema objeto de estudio antes y después de la intervención. N: 30

Nivel de conocimientos	Antes	%	Después	%
Malo	14	47	–	–
Regular	10	33	–	–
Bueno	6	20	30	100
Total	30	100	30	100

Fuente: Encuesta.