

**Comportamiento clínico-terapéutico del síndrome Guillain Barré en pacientes pediátricos durante 30 años en Camagüey. Anexos**

**Tabla No. 1 Distribución de variables socio demográficas.**

Edad	No	%
De 0-9 años	15	41
De 10-19 años	22*	59
<b>Sexo</b>		
Femenino	17	46
Masculino	20	54
<b>Raza</b>		
Blanca	25	68
Negra	3	8
Mestiza	9	24

Fuente: Historia clínica y formulario

\*P<0,5

**Tabla No. 2 Distribución según afectación de los reflejos, primeros síntomas de la enfermedad y de los trastornos motores.**

Afectación de los reflejos	No	%
Arreflexia	34*	92
Hipoarreflexia	3	8
<b>Síntomas y signos</b>		
Pérdida de la fuerza	35*	95
Pérdida de la fuerza + dolor	24	65
Parestesia	24	65
Diplopia	0	0
Cefalea	8	22
Parálisis facial	5	14
Trastornos de la deglución	5	14
Paresia	2	5
<b>Aspectos</b>		
<b>Trastorno motor</b>		
Forma de comienzo del defecto motor		
Paresia	36*	97
Parálisis	1	3
Localización del comienzo del defecto motor		
Miembros inferiores	36*	97
Miembros superiores	1	3
Otra localización	0	0
Forma de progresión del defecto motor		
De miembros inferiores a miembros superiores	18*	49
De miembros superiores a miembros inferiores	1	2
Afectación solo en miembros inferiores	18*	49
Afectación solo en miembros superiores	0	0
Período de estabilización		
Paraparesia de miembros inferiores	6	16
Cuadriparesia	7	19
Parálisis bilateral y simétrica de miembros inferiores	18*	49
Cuadriplejía	3	8
Paraplejía y paresia de miembros superiores	3	8

Fuente: Historia clínica y formulario

\*P<0,5

Tabla No. 3 Distribución según características del líquido cefalorraquídeo.

Período	Elemento	Características	No	%
Progresión	Célula	Aumentada	0	0
		Normal	37	100
	Glucosa	Aumentada	0	0
		Normal	37	100
		Disminuida	0	0
		Aumentada	15	41
Proteína	Normal	22	59	
	Disminuida	0	0	
Estabilización	Célula	Aumentada	0	0
		Normal	37	100
	Glucosa	Aumentada	0	0
		Normal	37	100
		Disminuida	0	0
		Aumentada	32	86
Proteína	Normal	5	14	
	Disminuida	0	0	
Recuperación	Célula	Aumentada	0	0
		Normal	37	100
	Glucosa	Aumentada	0	0
		Normal	37	100
		Disminuida	0	0
		Aumentada	26	70
Proteína	Normal	11	30	
	Disminuida	0	0	

Fuente: Historia clínica y formulario

Tabla No. 4 Distribución según evaluación de terapéutica específica utilizada y de la recuperación según combinación de tratamiento + utilizado.

Terapéutica			No	%
Exanguinotransfusión			1	3
Inmunoterapia			22*	59
Cambio de plasma			3	8
Combinación de tratamiento			32*	86
Corticosteroide			15	40
Antivirales			1	3
Filtración del fluido cerebro-espinal			0	0
Vitaminoterapia			27*	73
<b>Comienzo de la recuperación</b>	<b>Intaglobin + Vitamina</b>	<b>Corticosteroide + Vitaminas</b>	<b>No</b>	<b>%</b>
Antes de los 15 días	No	%	No	%
Entre los 15 y los 30 días	4	24	1	9
Entre los 30 y los 45 días	13*	62	2	9
Después de los 45 días	3	9	3	27
	1	5	7*	55

Fuente: Historia clínica y formulario

\*P<0,5