

Síndrome de túnel del carpo. Resultados del tratamiento quirúrgico

Anexos:



Figura 1. Territorio de inervación del nervio mediano en la palma de la mano.



Fig. 2. Sitio de aplicación de la anestesia local.




Fig. 3. Incisión de piel.

Tabla 1. Relación entre grupo de edad y sexo.

Sexo Edad (años)	Masculino		Femenino		Total	
	No	%	No	%	No	%
65 a 69	24	66,67	69	43,67	93	47,93
70 a 79	10	27,77	78	49,37	88	45,37
80 y más	2	5,56	11	6,96	13	6,70
Total	36	18,56	158	81,44	194	100.0
Edad media	67,4		76,1		74,9	

Fuente: Planilla de recogida de datos.

Nota: % sobre el total de cada sexo.

Tabla 2. Relación entre sexo y otras variables descriptivas.

Masculino*	Femenino*	Total**
Antecedente de trabajo manual previo		
11(30,5%)	143(73,71%)	154(79,38%)
Afectación bilateral		
4(11,12%)	38(24,05%)	42(21,65%)
Antecedentes de fractura de radio distal ipsilateral		
5(1,39%)	62(39,24%)	67(34,53%)
Antecedentes de diabetes		
2(5,56%)	22(13,92%)	27(13,91%)
Antecedentes de artritis reumatoide		
1(2,77%)	8(5,06%)	9(4,63%)
Antecedentes de otras afecciones tendinosas y/o de sus vainas		
12(33,3%)	93(58,86%)	105(54,12%)
Tiempo entre el inicio de los síntomas y la cirugía***		
13 meses	7 meses	8 meses
* % sobre el total de cada sexo.		
** % sobre el total de la muestra.		
*** tiempo promedio medido en meses.		

Fuente: Planilla de recogida de datos.

Tabla 3. Significación evolutiva del dolor antes y un año después de la cirugía.

Escala dolor antes de cirugía	Escala dolor al año de la cirugía					Total antes	
	0	1	2	3	4	No	%
6	5	-	-	-	-	5	2,58
7	14	2	-	-	-	16	8,25
8	30	11	5	1	1	48	24,74
9	32	17	12	3	3	67	34,54
10	26	15	10	5	2	58	29,89
Total	107	45	27	9	6	194	100.0
% total después	55,15	23,20	13,92	4,64	3,09	194	100,0

Fuente: Planilla de recogida de datos.

Nota: % sobre el total de la serie.

Tabla 4. Cuestionario de Levine para el global de los pacientes, en los tres subgrupos según la edad.

Variable Media	65 a 69 años		70 a 79 años		80 y más años		Global	
	Preop.	1 año posop.	Preop.	1 año posop.	Preop.	1 año posop.	Preop.	1 año posop.
Escala clínica	3,89	1,19	3,94	1,22	4,47	1,48	3,97	1,25
Escala funcional	3,86	1,04	4,13	1,25	4,64	1,78	4,03	1,27

Fuente: Planilla de recogida de datos.

(Valores entre 1: normalidad y 5: máxima afectación).