

Influencia de la tonificación de los músculos del suelo pélvico en la calidad de vida y sexualidad de mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo leve-moderada

Tabla 2: Descripción variables cuantitativas dependientes pre y post-tratamiento:

	ICIQ-SF PRE	ICIQ-SF POST	IQOL PRE	IQOL POST	PÉR D. PRE	PÉR D. POS	BRIN K PRE	BRIN K POST	PIS Q PRE	PISQ POST
N. VÁLIDOS	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7
PERDIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
MEDIA	11,38	4,25	50,13	28,88	6,13	0,88	6,25	9,00	103	107,57
D. TÍPICA	2,77	4,86	11,67	5,89	2,42	1,13	2,19	2,07	9,97	7,72
MÍNIMO	8	0	34	24	2	0	3	5	86	97
MÁXIMO	15	11	70	41	9	3	9	11	114	118

Tabla 3: Análisis comparativo (media $\pm$ desviación estándar) de las variables cuantitativas dependientes pre y post-programa:

	Inicial Media $\pm$ DP	Final Media $\pm$ DP	W p-valor
ICIQ-SF	11,38 $\pm$ 2,774	4,25 $\pm$ 4,862	0,012
I-QOL	50,13 $\pm$ 11,667	28,88 $\pm$ 5,890	0,012
PÉRDIDAS	6,13 $\pm$ 2,416	0,88 $\pm$ 1,126	0,012
BRINK	6,25 $\pm$ 2,188	9 $\pm$ 2,070	0,011
PISQ	103 $\pm$ 9,967	107,57 $\pm$ 7,721	0,042

W: Wilcoxon; DP: desviación estándar