

Caracterización clínico-epidemiológica de las várices de miembros inferiores en mujeres multíparas indígenas

Anexos:

Tabla n° 1: Edad Agrupada y Várices

Edad Agrupada	Várices				Total
	NO	%	Si	%	
De 14 a 44 años	273	98,9%	3	1,1%	276
De 45 a 59 años	47	97,9%	1	2,1%	48
De 60 y más años	4	36,4%	7	63,6%	11
Total	324	96,7%	11	3,3%	335

Fuente: Registro Personal

Tabla n° 2: Categoría ocupacional y Várices

Categoría ocupacional	Várices				Total
	NO	%	Si	%	
Comercio	48	94,1%	3	5,9%	51
Doméstica	262	97,8%	6	2,2%	268
Enfermera	6	75,0%	2	25,0%	8
Maestra	8	100,0%	0	0,0%	8
Total	324	96,7%	11	3,3%	335

Fuente: Registro Personal

Tabla n° 3: Número de Partos y Várices

Partos agrupados	Várices				Total
	NO	%	Si	%	
nulípara	0	0,0	1	100,0	1
De 1 a 3	117	97,5	3	2,5	120
De 4 a 6	164	99,4	1	0,6	165
Más de 6	43	87,8	6	12,2	49
Total	324	96,7	11	3,3	335

Fuente: Registro Personal

Tabla nº 4: Origen étnico y Várices

Origen étnico	Várices				Total
	NO	%	Si	%	
Maya-quiché	324	97,9	7	2,1	331
Ladino	0	0,0	4	100,0	4
Total	324	96,7	11	3,3	335

Fuente: Registro Personal

Tabla nº 5: Origen étnico, Edad y tipo de Várices según Prueba de Rivlin.

Origen étnico	Edad agrupada	Prueba de Rivlin (con várices)		Total
		Negativo	Positivo	
Maya-quiché	De 60 años y más	7	0	7
Ladino	De 14 a 44 años	0	3	3
	De 45 a 59 años	1	0	1
Total		8	3	11

Fuente: Registro Personal