

Factores asociados a la duración de la estancia hospitalaria por artrodesis de columna

Apéndices

1) Anexo 1

Recogida de datos:

Tabla de recogida de datos. Elaboración propia.

-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Demográficos:<ul style="list-style-type: none">o Edado Sexo- Antropométricos:<ul style="list-style-type: none">o Tallao Peso- Quirúrgicos:<ul style="list-style-type: none">o Diagnóstico:<ul style="list-style-type: none">▪ Degeneración▪ Fractura▪ Herniao Número de niveles vertebrales fusionados:<ul style="list-style-type: none">▪ 1▪ 2▪ 3▪ 4▪ 5▪ 6▪ 7o Lugar de intervención:<ul style="list-style-type: none">▪ Cervical▪ Dorsal▪ Lumbaro Intervención previa de columna<ul style="list-style-type: none">▪ Si▪ Noo Tipo intervención:<ul style="list-style-type: none">▪ Programada▪ Urgente- Comorbilidades previas, tipo:<ul style="list-style-type: none">o Cardíacao Pulmonaro Digestivao Endocrinao Urinariao Varias | <ul style="list-style-type: none">- Dispositivos:<ul style="list-style-type: none">o Catéter venoso periféricoo Sondao Oxígenoo Drenajeo Motivo de retiradao Apósitos- Tipo de analgesia:<ul style="list-style-type: none">o PCAo M1o M2o Y1o Y2o K1- Complicaciones post intervención:<ul style="list-style-type: none">o Estreñimientoo Hipotensióno Alergiao Mareoo Reintervencióno Acumulo de líquidoo Retención urinariao Disestesiaso Perforación duodenal- Medidas al alta:<ul style="list-style-type: none">o Collaríno Faja- Datos de evolución del paciente (horas):<ul style="list-style-type: none">o Primer cambio posturalo Sentar en una sillao Deambularo Primera micción espontáneao Retirada del drenajeo Retirada de analgesiao Realización radiografía de control- Días de ingreso post IQ- Días de ingreso total |
|--|--|
-

2) Anexo 2

Tabla descriptiva

VARIABLES	ETIQUETAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Sexo	Hombre	23	65,7%
	Mujer	12	34,3%
Cirugía de columna previa	NO	25	71,4%
	SI	10	28,6%
Diagnóstico	Degeneración	14	40%
	Fractura	14	40%
	Hernia	7	20%
Comorbilidad	No	18	52,9%
	Cardiaca	7	20,6%
	Pulmonar	1	2,9%
	Digestiva	2	5,9%
	Endocrina	1	2,9%
	Urinaria	1	2,9%
	Varias	4	11,6%
Tipo	Programada	28	80%
	Urgente	7	20%
Lugar	Cervical	8	22,9%
	Dorsal	3	8,6%
	Lumbar	24	68,6%
Niveles	1	10	28,6%
	2	18	51,4%
	3	5	14,3%
	4	1	2,9%
	7	1	2,9%
Catéter venoso periférico	SI	35	100%
	NO	0	0%
COMPLICACIONES	SI	19	52,8%
	NO	17	47,2%

FIEBRE	SI	9	25%
	NO	27	75%
Sonda	SI	31	87,5%
	NO	4	12,5%
Oxigeno	SI	16	45,5%
	NO	19	54,5%
Drenaje	SI	31	90%
	NO	4	10%
Motivo de retirada drenaje	Prescripción	30	96,2%
	Accidental	1	3,8%
Apósito	Limpio	20	58,1%
	Mancha	15	41,9%
PCA	SI	10	27,3%
	NO	25	72,7%
Tipo de analgesia	M1	18	51,5%
	M2	4	12,1%
	Y1	6	15,2%
	Y2	3	9,1%
	K1	2	6,1%
	nada	2	6,1%
Estreñimiento	SI	13	33,3%
	NO	22	66,7%
Hipotensión	SI	5	14,3%
	NO	30	85,7%
Complicaciones varias	Alergia	1	2,9%
	Mareo	3	8,6%
	Reintervención	1	2,9%
	Acúmulo de liquido	2	5,7%
	Retención urinaria	2	5,7%
	Disestesias	1	2,9%
	Perforación duodenal	1	2,9%

Medidas al alta	Collarín	5	14,3%
	Faja	22	62,9%
	Nada	8	22,8%

	MEDIA	DESVIACIÓN
Edad (años)	48,71	(16,71)
Talla (cm)	1,66	(0,11)
Peso (kg)	79,92	(14,41)
IMC (kg/m2)	28,36	(4,1)
Radiografía (días)	2,17	(0,79)
	MEDIANA	MIN-MAX
Cambio de postura (h)	5	(3-12)
Sentar en silla (h)	24	(22,75-36)
Deambula (h)	36	(24-72)
Micción (h)	3	(3-10)
Tolerancia (h)	6	(3-24)
Retirada drenaje (h)	24	(24-72)
Cantidad de analgesia (mg/dl)	23,56	(16,87-56,49)
Retirada de analgesia (h)	48	(24-72)
Días de ingreso (días)	6	(3-28)
Días de ingreso tras IQ	5	(2-27)

Tabla nº1 Fuente Excel 2007: Elaboración Propia "Datos Grupo Diana"