

## Factores de riesgo modificables en la enfermedad cerebrovascular isquémica aterotrombótica

### TABLAS

Cuadro 1. Relación de pacientes con hipertensión arterial y sus diferentes estadios según JNC-7

Hipertensión arterial	Número	%
Pre hipertensión	17	9.8
Estadio I	71	41.2
Estadio II	84	48.8
Total	172	100

Fuente: Registro de datos

Autor: Mayra Juana Morales del Rey

Cuadro 2. Relación de pacientes con otros factores de riesgo modificables.

Factores de riesgo	Número	%
Diabetes Mellitus	88	47.0
Hipercolesterolemia	71	38.5
Obesidad y/o sedentarismo	68	36.3
Consumo de alcohol	58	31.0
Consumo de tabaco/cigarro	112	59.8
Consumo de Drogas Adictivas	2	1.0
Combinación de Factores de Riesgo	168	89.8

Fuente: Registro de datos

Autor: Mayra Juana Morales del Rey

Cuadro 3. Grupos farmacológicos en el tratamiento previo de la hipertensión arterial en pacientes con enfermedad cerebrovascular aterotrombótica.

Grupo farmacológico	Número	%
Tiazidas	42	28.4
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina	30	20.2
B-bloqueadores	27	18,2
Anti cálcicos	24	16,2
Combinaciones	25	17.0
Total	148	100

Fuente: Registro de datos

Autor: Mayra Juana Morales del Rey