

Moxibustión: Una alternativa de tratamiento del Síndrome de dolor miofacial

Anexos

TABLA I: Distribución de los grupos estudio y control, según el grado de dolor referido en la primera consulta.

Dolor	Total	Grupo estudio		Grupo control	
		Nº	%	Nº	%
Leve	22	9	40.9	13	59.3
Moderado	51	29	56.8	22	43.1
Severo	9	3	33.3	6	66.6
Total	82	41	50.0	41	50.0

Fuente: Ficha de vaciamiento

TABLA II: Distribución de pacientes por grupos de edades según esquema de tratamiento impuesto.

Grupos de Edades	Total	Esquema de tratamiento			
		Convencional		Moxibustión	
		Nº	%	Nº	%
30 - 39	15	11	73.3	4	26.6
40 - 49	10	8	80.0	2	20.0
50 - 59	21	11	52.3	10	47.6
60 - 69	16	5	31.2	11	68.7
70 - 79	9	3	33.3	6	66.6
80 y más	11	3	27.2	8	72.7
Total	82	41	50.0	41	50.0

Fuente: Ficha de vaciamiento.

TABLA III: Distribución del esquema de tratamiento impuesto según evolución de los pacientes.

Esquema de tratamiento	Total	Evolución					
		Muy Satisfactoria		Satisfactoria		NO Satisfactoria	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
Convencional	41	13	31.7	12	29.2	16	39.1
Moxibustión	41	18	43.9	16	39.1	7	17.0
Total	82	31	37.8	28	34.1	23	28.0

TABLA IV: La suspensión de los síntomas, según los grupos estudio y control.

Suspensión de los síntomas	Total	Grupo estudio		Grupo control	
		Nº	%	Nº	%
Parcialmente	17	4	9.7	13	31.7
Totalmente	51	33	80.6	18	43.9
Persistencia	14	4	9.7	10	24.4
Total	82	41	50.0	41	50.0

Fuente: Ficha de vaciamiento