

Síndrome de Kounis tipo II por tramadol: ¿alergia o infarto?

Figura 1:




Figura 2:

Tabla 1. Causas de síndrome de Kounis

Condiciones clínicas	Fármacos	Agentes ambientales
Angio-edema	Antibióticos	Mordedura de hormiga
Asma bronquial	Analgésicos	Picadura de abeja
Anafilaxia inducida por ejercicio	Antineoplásicos	Picadura de avispa
Alergia a alimentos	Medios de contraste	Medusas
Mastocitosis	Anestésicos intravenosos	Venenos
Enfermedad del suero	Antiinflamatorios no esteroidales (AINES)	Latex
Urticaria	Desinfectantes de piel	
	Corticosteroides	
	Trombolíticos	Ingestión de moluscos
	Anticoagulantes	Veneno de víbora
	Otros	

Adaptado de Kounis NG. Kounis syndrome (allergic angina and allergic myocardial infarction): A natural paradigm? *Int J Cardiol* 2006; 110: 7-14.

Figura 3:

Síntomas	Signos	Electrocardiograma
Dolor torácico	Hipotensión arterial	T negativa o aplanada
Disnea	Diaforesis	Ascenso/descenso del ST
Debilidad	Palidez	QRS ancho
Malestar	Palpitaciones	Prolongación del QT
Náuseas	Bradicardia	Taquicardia sinusal
Vómitos	Taquicardia	Bradicardia sinusal
Disfagia	Parada cardiorrespiratoria	Ritmo nodal
Síncope		Fibrilación auricular
Prurito		Extrasístoles
Urticaria		Bigeminismo