

Ictus en personas menores de 50 años – Anexos

Tabla 1. Distribución por sexo según grupo etario. Hospital Clínico Quirúrgico “Comandante Manuel Fajardo”. 2011-2012.

Grupo etario (años)	Femenino		Masculino		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
50-46	9	37,5	12	40,0	21	38,9
45-41	7	29,2	9	30,0	16	29,6
40-36	4	16,7	4	13,3	8	14,8
35-31	1	4,1	3	10,0	4	7,4
30 o menos	3	12,5	2	6,7	5	9,3
Total	24	100	30	100	54	100

Fuente: Historias clínicas de los pacientes con ictus. Hospital Clínico Quirúrgico “Comandante Manuel Fajardo”.

Tabla 2. Etiología del Ictus según grupo etario.

Grupo etario (años)	Isquémicos					Hemorrágicos						
	CE	AT	L	CID	CIH	Total		HIP	HSA	Total		
						No.	%			No.	%	
50-46	2	5	5	1	0	13	40,6	4	3	7	31,8	
45-41	2	3	2	1	0	8	25,0	6	2	8	36,4	
40-36	1	1	0	2	0	4	12,5	3	1	4	18,2	
35-31	0	0	2	1	0	3	9,4	1	0	1	4,5	
30 o menos	0	0	1	1	2	4	12,5	2	0	2	9,1	
Total	5	9	10	6	2	32	100	16	6	22	100	

Leyenda: CE: cardioembólico; AT: aterotrombótico; L: lacunar; CID: causa indeterminada; CIH: causa inusual; HIP: Hemorragia intraparenquimatosa; HSA: hemorragia subaracnoidea.

Tabla 3. Distribución de los factores de riesgo según etiología del ictus.

Factores de riesgo	Isquémico (n=32)		Hemorrágico (n=22)		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Hipertensión Arterial	14	43,8	17	77,3	31	57,4
Hábito de fumar	11	34,4	8	36,4	19	35,2
Dislipidemias	7	21,9	1	4,5	8	14,8
Ictus previo	6	18,8	2	9,1	8	14,8
Diabetes Mellitus	4	12,5	1	4,5	5	9,3
Anticonceptivos orales	4	12,5	0	0,0	4	7,4
Alcoholismo	2	6,3	2	9,1	4	7,4
Obesidad	3	9,4	0	0,0	3	5,6
Otros	2	6,3	1	4,5	3	5,6

Tabla 4. Distribución de los factores de riesgo por grupos etarios.

Factores de riesgo	50-36 años (n=45)		35 años o menos (n=9)		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Hipertensión Arterial	27	60,0	4	44,4	31	57,4
Hábito de fumar	11	24,4	8	88,9	19	35,2
Ictus previo	8	17,8	0	0,0	8	14,8
Dislipidemias	7	15,5	1	11,1	8	14,8
Diabetes Mellitus	5	11,1	0	0,0	5	9,3
Anticonceptivos orales	0	0,0	4	44,4	4	7,4
Alcoholismo	1	2,2	3	33,3	4	7,4
Obesidad	2	4,4	1	11,1	3	5,6
Otros	2	4,4	1	11,1	3	5,6

Tabla 5. Presencia de complicaciones según etiología del Ictus.

Complicaciones	Isquémico (n=32)		Hemorrágico (n=22)		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Vasoespasmo	0	0,0	2	9,1	5	9,3
Desequilibrios hidroelectrolíticos	1	3,1	1	4,5	2	3,7
Tromboembolismo pulmonar	1	0,0	0	0,0	4	7,4
Sepsis nosocomial	3	9,4	0	0,0	3	5,6
Edema cerebral	0	0,0	7	31,8	7	13,0
Coma	0	0,0	2	9,1	2	3,7
Hipertensión endocraneana	0	0,0	3	13,6	2	3,7
Convulsiones	0	0,0	3	13,6	2	3,7
Resangrado	0	0,0	1	4,5	1	1,9
Sin complicaciones	27	87,0	8	36,4	32	59,3

Tabla 6. Estadía hospitalaria de los pacientes con ictus isquémico y hemorrágico.

Estadía hospitalaria	Isquémico (n=32)		Hemorrágico (n=22)	
	No.	%	No.	%
Menos de 3 días	4	12,5	8	36,4
3-10 días	21	65,6	3	13,6
11-20 días	6	18,8	6	27,3
más de 20 días	1	3,1	5	22,7