

## Anexo

Imagen número 1: Escala de deshidratación clínica para niños.

Característica	Puntaje 0	Puntaje 1	Puntaje 2
<b>Apariencia general</b>	Normal <sup>b</sup>	Sediento, intranquilo o letárgico pero irritable al tocarlo	Somnoliento, sudoroso, frío; comatoso o no
<b>Ojos</b>	Normal	Ligeramente hundidos	Muy hundidos
<b>Mucosas<sup>c</sup></b>	Húmedas	Semihúmedas	Secas
<b>Lágrimas</b>	Con lágrimas	Disminuidas	Sin lágrimas

*Se suman los puntajes de los ítems individuales.*

*<sup>a</sup> Los mayores puntajes indican una deshidratación más severa. Los puntajes varían de 0 a 8. Un puntaje de 0 se correlaciona con una deshidratación < 3% (razón de probabilidad positiva 2,2; IC 95% 0,9-5,3), puntajes de 1-4 se correlacionan con algo (3%-6%) de deshidratación (razón de probabilidad positiva 1,3; IC 95% 0,9-1,7), y de 5-8 se correlacionan con deshidratación (≥ 6%) moderada a severa (razón de probabilidad positiva 5,2; IC 95% 2,1-12,8).*

*<sup>b</sup> "Normal" incluye a niños que pueden estar dormidos, pero que se despiertan fácilmente a un nivel normal de conciencia. Esta evaluación tiene en cuenta el momento del día y el patrón habitual del niño, según lo descrito por el tutor del niño.*

*<sup>c</sup> Evaluado en mucosa bucal y lengua, y no en los labios.*