

Tintura de Manzanilla en el tratamiento de la estomatitis subprótesis - Tablas

Tabla 1. Distribución de pacientes con estomatitis subprótesis según grupo de edades. HCSM. Manzanillo

Grupos de edades	Pacientes afectados	
	Nº	%
20-35	16	17,7
36-50	20	22,2
51-65	13	14,4
66-70	41	45,5
Total	90	100

Tabla 2. Distribución de pacientes con estomatitis subprótesis según sexo. HCSM. Manzanillo.

Sexo	Pacientes afectados	
	Nº	%
Femenino	66	73,3
Masculino	33	26,6
Total	90	100

Tabla 3. Distribución de pacientes con estomatitis subprótesis según grados clínicos de la enfermedad.

Grados clínicos	Pacientes afectados	
	Nº	%
Grado I	40	44,4
Grado II	50	55,5
Total	90	100

Tabla 4. Relación entre el desajuste de las prótesis y la estomatitis subprótesis. HCSM. Manzanillo.

Prótesis	Pacientes afectados	
	Nº	%
Ajustadas	8	38,4
Desajustadas	25	27,7
Total	63	70

Tabla 5. Relación entre la higiene de las prótesis de las prótesis y la estomatitis subprótesis. HCSM. Manzanillo.

Higiene de la prótesis			Pacientes afectados	
	Nº	%	Nº	%
Buena	15	16,6	2	13,3
Regular	27	30	19	70,3
Mala	48	53,3	40	83,3
Total	90	100	61	67,7

Tabla 6. Aplicación de la tintura de Manzanilla en la estomatitis subprótesis grado I y curación según tiempo de evolución HCSM. Manzanillo.

Tiempo de evolución (días)	Pacientes curados	
	Nº	%
7	9	22,5
15	17	42,5
21	9	22,5
Al mes	5	2,5
Total	40	100

Tabla 7. Aplicación de la tintura de Manzanilla en la estomatitis subprótesis grado II y curación según tiempo de evolución HCSM. Manzanillo.

Tiempo de evolución (días)	Pacientes curados	
	Nº	%
7	9	18
15	12	24
21	21	42
Al mes	8	18
Total	50	100